

Telmatogeton remanei REMMERT (*Chironomidae*, *Diptera*)
w Polsce

Telmatogeton remanei REMMERT (*Chironomidae*, *Diptera*) in Poland

NAPISAL

RYSZARD SZADZIEWSKI

ABSTRACT. The second record of *Telmatogeton remanei* REMMERT 1963 (= *T. gedanensis* SZADZIEWSKI, 1977, syn. n.) near large Polish port confirms the thesis of REMMERT on carrying them to Europe by ship traffic.

Morski ochotek — *Telmatogeton remanei* REMMERT, 1963 (= *T. gedanensis* SZADZIEWSKI, 1977, syn. n.) po raz pierwszy został opisany z okolic Kilonii (RFN).

Drugie stanowisko tego gatunku w pobliżu portów Gdańsk i Gdynia Zatoce Gdańskiej (SZADZIEWSKI, 1977), gdzie panuje duży ruch statków, potwierdza tezę REMMERTA (1963) o przywleczeniu go do Europy, prawdopodobnie z wybrzeży Pacyfiku. Larwy i poczwarki mogły z łatwością przetrwać podróż na porośniętych przez glony burtach szybkich statków. W warunków naturalnych stadia preimaginalne żyją wśród glonów porastających kamienie obryzgiwane przez wodę morską.

Na terenie Polski *T. remanei* jest drugim przedstawicielem pierwotnie morskiego plemienia *Clunionini*, obok podanego z Zatoki Puckiej *Clunio marinus* HALIDAY (ŻMUDZIŃSKI, 1967).

Serdecznie dziękuję drowi B. LINDEBERGOWI z Finlandii za informację o znalezieniu przedstawiciela rodzaju *Telmatogeton* przez REMMERTA.

PIŚMIENNICTWO — REFERENCES

- REMMERT, H., 1963, *Telmatogeton remanei* n. sp., eine neue marine *Chironomide* aus der Kieler Förde, Zool. Anz., **171**: 165-178.
- SZADZIEWSKI, R., 1977, *Telmatogeton gedanensis* sp. n. (*Clunioninae*, *Chironomidae*, *Diptera*) — new marine chironomid from Polish coast of Baltic, Pol. Pismo ent., **47**: 175-184.
- ŻMUDZIŃSKI, L., 1967, Zoobentos Zatoki Gdańskiej, Prace Morskiego Instytutu Rybackiego, **14** (A): 47-80.

ul. Polanki 94, 80-302 Gdańsk